



PATIENT INFORMATION

سب ایکرو میل ڈی کمپریشن (Subacromial) (Decompression)

سب ایکرو میل برسا (subacromial bursa)، یعنی ایکرومین (acromion) کے نیچے سیال سے بھری وہ گدی جس میں کندھے کے اچھٹٹ (کندھے میں ٹینڈن کارر کھانا) میں سوزش ہو جاتی ہے۔

4.0 © ① © Kieran Hirpara

اس صفحے کا ترجمہ مشین سے کیا گیا ہے اور ابھی تک کسی ڈاکٹر نے اس کی جانچ نہیں کی۔ انگریزی نسخہ ہی مستند ہے۔

یہ آپریشن کیوں تجویز کیا گیا ہے

ڈاکٹر کیرن ہیرا، جو Mater Private Hospital Rockhampton میں بازو اور ہاتھ کے سرجن (upper-limb surgeon) ہیں، آپ کے مسئلے کے مطابق سب سے کم چیر پھاڑ والے طریقوں سے آغاز کرتے ہیں۔ مریضوں کو عام طور پر ان کے فیملی ڈاکٹر (GP) ہمارے کلینک ریفر کرتے ہیں؛ اگر کسی فزیو تھراپسٹ نے آپ کو ہمارے پاس آنے کا مشورہ دیا ہے، تب بھی میڈیکر (Medicare) کی رقم کی واپسی کا حق دار ہونے کے لیے آپ کو اپنے فیملی ڈاکٹر سے ریفرل (referral) کی ضرورت ہوگی۔ کلینک میں ملاقات پر ہم آپ سے تفصیل پوچھتے ہیں، آپ کے کندھے کا معائنہ کرتے ہیں اور ضرورت ہو تو ایکس رے یا اسکلین کا انتظام کرتے ہیں۔ اس سے کندھے کے درد کی دوسری وجوہات، جیسے فروزن شوڈر (کندھے کا جم جانا) یا پھٹا ہوا ٹینڈن، خارج کی جاتی ہیں۔

سب ایکرو میل ڈیکمپریشن (subacromial decompression)، یعنی کندھے میں ٹینڈنوں کے اوپر کی جگہ کھولنے کا آپریشن (ایک ایسا آپریشن ہے جو روٹٹر کف (rotator cuff)، یعنی ٹینڈنوں کا وہ گروپ جو کندھے کو تھامت اور کھماتا ہے، کے اوپر کی جگہ میں زیادہ گنجائش پیدا کرتا ہے۔ یہ اس وقت پیش کیا جاتا ہے جب آپ کا درد اچھٹٹ (کندھے میں ٹینڈن کارر کھانا) کے انداز سے ملتا ہو، یعنی بازو اٹھاتے وقت ٹینڈن دب جاتے ہوں، اور جب سرجری کے بغیر علاج سے کافی بہتری نہ ملے ہو۔ اس علاج میں عام طور پر سرکرمیوں میں تبدیلی، فزیو تھراپی اور انجکشن شامل ہوتے ہیں۔ ہم سرجری کا مشورہ صرف آپ کے ساتھ مل کر آپ کے معائنے اور اسکلینوں کا جائزہ لینے کے بعد دیں گے۔ جب یہ سب وجوہات کے لیے کیا جائے، تو زیادہ تر لوگوں، یعنی 70 سے 75 فیصد، کو اس آپریشن سے فائدہ ہوتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ بازو اٹھاتے وقت درد کم ہو اور آپ اپنا کندھا بہتر طریقے سے استعمال کر سکیں۔

آپریشن سے پہلے

جب سرجری طے ہو جائے، تو چند آسان تیاریاں آپریشن کے دن کو آسانی سے گزارنے میں مدد دیتی ہیں۔ آپ کے سرجن کے پاس آپریشن کی منصوبہ بندی کے لیے ضروری اسکلین پہلے سے موجود ہوں گے، جیسے ایکس رے، ایم آر آئی یا الٹراساؤنڈ۔ اپنے آپریشن سے سات گھنٹے پہلے کچھ نہ کھائیں اور نہ پیئیں۔ ہم چھ کے بجائے سات گھنٹے اس لیے کہتے ہیں تاکہ اگر آپریشن کی فہرست وقت سے پہلے چل رہی ہو تو آپ کا وقت پہلے کیا جا سکے۔ اگر آپ باقاعدگی سے دوائیں لیتے ہیں، تو ان کی کھلی ہوئی فہرست ساتھ لائیں اور اپنے سرجن سے پوچھیں کہ کیا ان میں سے

کوئی دوا پہلے سے روکنی ہے۔ آپریشن کے بعد آپ کو گاڑی میں گھر لے جانے کے لیے کسی کا انتظام کریں، کیونکہ آپ خود گاڑی نہیں چلا سکیں گے۔ ڈھیلے، آرام دہ کپڑے پہنیں جو آسانی سے اتارے جاسکیں۔ اگر آپ کو دوسری طبی بیماریاں ہیں، تو آپریشن کے دن سے پہلے آپ کو خون کے ٹیسٹ یا بے ہوشی کے ڈاکٹر (anaesthetist) سے معائنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔

آپریشن کے دن

آپ ہسپتال کے سرجری کے داخلے کے شعبے میں پہنچتے ہیں، جہاں آپ کا اندراج کیا جاتا ہے اور آپ کو آپریشن تھیٹر کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ پھر آپ بے ہوشی کے ڈاکٹر سے ملیں گے، یعنی وہ ڈاکٹر جو آپ کی بے ہوشی اور درد میں آرام کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ یہ آپریشن جنرل اینسٹھیسیا (مکمل بے ہوشی) کے ساتھ اعصابی بلاک (nerve block)، یعنی ایک انجکشن جو جسم کے ایک حصے کو سُن کر دیتا ہے، ملا کر کیا جاتا ہے۔ بے ہوشی کے ڈاکٹر آپریشن سے پہلے آپ سے ملیں گے اور آپ کو دونوں حصوں کے بارے میں سمجھائیں گے۔

جب سب کچھ تیار ہو جائے، تو آپ کو آپریشن تھیٹر میں لے جایا جاتا ہے اور آپریشن کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ ریکوری روم میں جاگتے ہیں، جہاں بے ہوشی کا اثر ختم ہونے تک نرسس آپ کی نگرانی کرتی ہیں۔ وہ آپ کے کندھے، آپ کے آرام اور بے ہوشی سے آپ کی بحالی کی جانچ کریں گی۔ جب آپ کی حالت مستحکم ہو جائے، تو آپ کے آپریشن اور آپ کی صحت یابی کے لحاظ سے آپ یا تو وارڈ میں منتقل ہوتے ہیں یا گھر چلے جاتے ہیں۔ لوگ عام طور پر کتنا عرصہ رہتے ہیں، یہ آپریشن کے بعد والے حصے میں بتایا گیا ہے۔

آپریشن میں کیا کیا جاتا ہے

سب ایکرو میل ڈیکمپریشن دور میں کے ذریعے آپریشن (keyhole) ہے۔ آپ کے سرجن آپ کے کندھے کے ارد گرد چند چھوٹے چیرے لگاتے ہیں، جن میں سے ایک پیچھے کی طرف ہوتا ہے، اور ان کے ذریعے ایک چھوٹے کپڑے اور پتلے اوزاروں سے کام کرتے ہیں۔ کپڑے کی مدد سے آپ کے سرجن روٹیٹر کف، یعنی ٹینڈوں کا وہ گروپ جو آپ کے کندھے کو حرکت دیتا ہے، کے اوپر کی جگہ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔

اندر پہنچنے کے بعد، آپ کے سرجن کچھ سوچا ہوا ٹشو، جسے برسا (سپال سے بھری چھوٹی تھیلی) کہتے ہیں، نکال دیتے ہیں اور ایکرو مین (acromion)، یعنی ٹینڈوں کے اوپر ہڈی کی پیچھے جیسی سطح، کے پچھلے حصے سے ہڈی کا ایک چھوٹا ٹکڑا چھیل کر ہٹا دیتے ہیں۔ یہ ہڈی اور ٹشو نکالنے سے زیادہ جگہ بن جاتی ہے، تاکہ بازو اٹھاتے وقت ٹینڈن مزید نہ دبیں۔ آپریشن کے اس حصے کو ایکرو میوپلاسٹی (acromioplasty) کہتے ہیں۔ اگر آپ کے سرجن کو کوئی اور چیز ملے جس پر توجہ کی ضرورت ہو، جیسے پھٹا ہوا ٹینڈن، تو وہ اس بارے میں پہلے سے آپ سے بات کریں گے۔

کام مکمل ہونے پر، آپ کے سرجن کندھے کو دھو کر صاف کرتے ہیں اور ہر چھوٹے چیرے کو ٹانکوں سے بند کر دیتے ہیں۔ زخموں پر زخم کی پٹی لگائی جاتی ہے، اور یہ تقریباً 10 دن تک لگی رہتی ہے۔

آپریشن کے بعد

زیادہ تر مریض اس آپریشن کے بعد ایک رات ہسپتال میں رہتے ہیں، اگرچہ کچھ مریض اسی دن گھر جاسکتے ہیں۔ آپ ریکوری روم میں جاگیں گے، پھر رات گزارنے کے لیے وارڈ میں منتقل ہوں گے۔ آرام کے لیے آپ کا بازو ایک سادہ سلنگ (sling)، یعنی گلے سے لٹکی وہ پٹی، جو بازو کو سہارا دیتی ہے، میں رہتا ہے؛ اسے ورزش اور نہانے دھونے کے لیے اتارا جاتا ہے۔ نرسیں دواؤں کے ذریعے کسی بھی درد کو سنبھالنے میں آپ کی مدد کریں گی۔ گھر پہنچنے کے بعد پہلے 24 گھنٹوں تک کسی کو آپ کے سرتھ رہنا چاہیے۔ اگر آپ کو اعصابی بلاک دیا گیا تھا، تو شروع میں آپ کا بازو بھاری یا سُن محسوس ہو سکتا ہے؛ یہ متوقع ہے اور تقریباً 24 گھنٹوں کے اندر ختم ہو جاتا ہے۔ اگر بلاک کا اثر ختم ہونے کے بعد بھی سُن پن یا کمزوری باقی رہے، تو کلینک فون کریں۔ ہم پٹی تقریباً 10 دن تک لگی رہنے دیتے ہیں؛ جب تک ہم نہ کہیں، براہ کرم اس سے پہلے اسے نہ اتاریں۔ جب ہم آپ کو دیکھیں گے تو اسے بدلیں گے یا اتار دیں گے۔

صحت یابی

پہلے چند دن آپ کے کندھے میں درد اور سوجن رہے گی۔ اگلے ہفتوں میں سوجن آہستہ آہستہ کم ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ درد بھی کم ہوتا جاتا ہے۔ آپ کی دیکھ بھال کرنے والی ٹیم کی تجویز کردہ دوائیں، برف کی تھیلیاں اور آرام، سب ابتدائی دنوں میں مدد دیتے ہیں۔ آرام کے لیے آپ کا بازو ایک سادہ سلنگ میں رہتا ہے؛ اسے ورزش اور نہانے دھونے کے لیے اتارا جاتا ہے۔

آپریشن کے کچھ ہی عرصے بعد آپ اپنے فزیو تھراپسٹ کی رہنمائی میں ہلکی ورزشیں شروع کریں گے۔ یہ ٹشو کے بھرنے کے دوران کندھے کو اکڑنے سے بچاتی ہیں۔ روزمرہ کے کام، جیسے کہ پڑے پہننا، کھانا کھانا اور میز پر ٹائپ کرنا، عام طور پر شروع سے ہی کیے جاسکتے ہیں۔ چائے کے ایک کپ سے زیادہ بھاری کوئی چیز اٹھانا، یا کندھے کی اونچائی سے اوپر ہاتھ بڑھانا، اس وقت تک انتظار کرے گا جب تک آپ کا کندھا تیار نہ ہو جائے۔ شروع میں سونا تکلیف دہ ہو سکتا ہے؛ بہت سے لوگوں کو کرسی پر ٹیک لگا کر یا پیچھے تکیے رکھ کر سونا آسان لگتا ہے۔

جب سوجن کم ہو جائے اور آپ کی حرکت واپس آجائے، تو روزمرہ کی سرگرمیاں زیادہ قدرتی محسوس ہوتی ہیں۔ آپ کے سرجن کی اجازت کے بعد آپ گاڑی چلا سکتے ہیں، جو عام طور پر چھ ہفتے بعد کے معائنے پر ملتی ہے؛ **بازو اور ہاتھ کی سرجری کے بعد گاڑی چلانا** والی ہماری رہنمائی دیکھیں۔ کام، کھیل اور زیادہ بھاری سرگرمیوں پر واپسی بتدریج ہوتی ہے، اور آپ کے سرجن اور فزیو تھراپسٹ آپ کو بتائیں گے کہ ہر قدم کب محفوظ ہے۔

صحت یابی ہر شخص میں مختلف ہوتی ہے۔ آپ کا وقت اوپر دیے گئے جدول میں دکھائے گئے عام اندازوں سے مختلف ہو سکتا ہے، اور آپ کے سرجن اور فزیو تھراپسٹ اس دوران آپ کی رہنمائی کریں گے۔

کیا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں

زیادہ تر مریض ٹھیک رہتے ہیں، لیکن کبھی کبھار مسائل ہو سکتے ہیں۔ آپ کا سرجن اور ٹیم کسی بھی مسئلے کو جلد پکڑنے کے لیے آپ کی قریب سے نگرانی کرتے ہیں۔

کبھی کبھی اس جگہ نئی بڑی بن جاتی ہے جہاں سے ہڈی کا چھوٹا ٹکڑا پھیل کر ہٹایا گیا تھا۔ یہ ایسا محسوس ہو سکتا ہے جیسے پرانا دبنے والا درد واپس آگیا ہو، اور بازو اٹھاتے وقت اٹکنے یا رکڑ کا احساس ہو۔ اگر ایسا ہو، تو اپنے اگلے معائنے پر اس کا ذکر کریں۔

کندھا اکڑ کر دردناک بھی ہو سکتا ہے، اور اس کی حرکت ہلکی ورزشوں کے باوجود نہیں کھلتی۔ اگر یہ بہتر نہ ہو تو اپنے فزیو تھراپسٹ کو بتائیں یا کلینک فون کریں۔

کبھی کبھار پتہ چلتا ہے کہ درد کسی اور وجہ سے ہے، جیسے پھٹا ہوا اینڈن یا قریب کے کسی جوڑ میں آرتھرائٹس (جوڑ کی خرابی اور سوزش)۔ اگر ابتدائی بھرنے کا عمل مکمل ہونے کے بعد بھی آپ کے کندھے میں تقریباً پہلے جیسی ہی دھن ہو، تو ہم آپ کے معائنے پر آپ کے ساتھ مل کر اصل تشخیص کا دوبارہ جائزہ لیں گے۔

شاذ و نادر ہی، خون کا لو تھرا بن سکتا ہے۔ اگر آپ کی پنڈلی کے پچھلے حصے میں سوجن یا درد ہو، یا اچانک سانس پھولے یا سینے میں درد ہو، تو ہسپتال کی ایمرجنسی جائیں۔ یہ خون کے لو تھرے کی علامات ہو سکتی ہیں۔

اگر آپ کو بخار ہو، کسی زخم سے باہر کی طرف سرخی پھیل رہی ہو، یا زخم سے رطوبت یا پیپ رس رہی ہو، تو اسی دن کلینک فون کریں۔ اگر درد دواؤں کے باوجود درد بڑھتا ہی جائے، تو بھی اسی دن کلینک فون کریں۔

اگر اعصابی ہلاک کا اثر ختم ہونے کے بعد، یعنی تقریباً 24 گھنٹے بعد، بھی آپ کے بازو، ہاتھ یا انگلیوں میں سُن پن یا کمزوری باقی رہے، تو کلینک فون کریں۔ پہلے 24 گھنٹوں میں سُن پن اور کمزوری متوقع ہے۔

اگر آپ تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو اس صفحے پر پیچیدگیوں کا جدول عام شرحیں بتاتا ہے۔

ہمیں کب فون کریں

زیادہ تر مسائل جلد ظاہر ہو جاتے ہیں، اس لیے یہ جاننا مددگار ہے کہ کن باتوں پر نظر رکھنی ہے۔ اگر آپ کی پنڈلی کے پچھلے حصے میں سوجن یا درد ہو، یا اچانک سانس پھولے یا سینے میں درد ہو، تو ہسپتال کی ایمرجنسی جائیں۔ یہ خون کے لو تھڑے کی علامات ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ کو بخار ہو، کسی زخم سے باہر کی طرف سرخی پھیل رہی ہو، یا زخم سے رطوبت یا پیپ رس رہی ہو، تو اسی دن کلینک فون کریں۔ اگر درد کش دواؤں کے باوجود درد بڑھتا ہی جائے، تو بھی اسی دن کلینک فون کریں۔ اگر اعصابی ہلاک کا اثر ختم ہونے کے بعد، یعنی تقریباً 24 گھنٹے بعد، بھی آپ کے بازو، ہاتھ یا انگلیوں میں سُن پن یا کمزوری باقی رہے، تو کلینک فون کریں۔ پہلے 24 گھنٹوں میں سُن پن اور کمزوری متوقع ہے۔ اگر آپ کلینک سے رابطہ نہ کر سکیں، تو اپنے قریب ترین ہسپتال کی ایمرجنسی جائیں۔

اس مسئلے کے بارے میں مزید کہاں پڑھیں

یہ صفحہ خود آپریشن کے بارے میں ہے۔ جس مسئلے کا یہ علاج کرتا ہے، اس کی تفصیل، بشمول اس کے کہ شواہد کیا بتاتے ہیں کہ سرجری کب مدد کرتی ہے اور کب نہیں، **سب ایکرو میل اینجمنٹ اور برسا کی سوزش** والے صفحے پر دی گئی ہے۔